

Mise en place et suivi d'un traitement par SELINCRO®

Congrès stage Niveau II 2015

Pauline GUYOT

5^{ème} semestre DES de Médecine générale

SELINCRO[®] = Nalméfène

Aide à la **réduction** de la consommation d'alcool

- AOTAL[®] (acamprosate)
- REVIA[®] (naltrexone)
- ...

INDICATIONS

- Patient adulte
- **Dépendance** à l'alcool
- Consommation **à risque élevé**
- Pas de symptômes physiques de sevrage
- Pas de nécessité de sevrage immédiat

POSOLOGIE

- 1 comprimé par jour
- 1 à 2 heures avant le début des consommations
- Tous les jours
- **Suivi psychosocial indispensable**

Effets indésirables : Insomnie, sensation de vertige, céphalée, nausée.

Contre-indications :

■ OPIOIDES

- Antécédent récent de sevrage
- Hypersensibilité au produit
- Insuffisance rénale sévère
- Insuffisance hépatique sévère
- Intolérance au galactose

Schéma de prise en charge

- Après 2 semaines
 - **1er consultation** : diagnostic de **dépendance** à l'alcool, nécessité d'un sevrage?
 - **2^{ème} consultation** : si toujours consommation à risque élevé : proposition SELINCRO® + **suivi psychosocial**.
- Après 2 semaines
 - **3^{ème} consultation** : vérifier la **tolérance** et observance.
- Après 1 mois de traitement
 - **4^{ème} consultation** : **évaluation des consommations** et du suivi psychosocial.
- Après 6 mois de traitement
 - **5^{ème} consultation** : **réévaluation** du traitement.

BIBLIOGRAPHIE

- Résumé des Caractéristiques du produit Selincro®.
- Avis de la Commission de la Transparence Selincro®.
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/evamed/CT-12915_SELINCRO_PIC_INS_Avis3_CT12915.pdf
- Miller *et al.* Enhancing motivation for change in substance abuse treatment (U.S Department of Health and Human Services, Center for Substance Abuse Treatment), *Treatment Improvement Protocol No.35*, 1999 Rev.2012.