

# La morphine par voie SC

Outil dans l'urgence douleur au cabinet




Congrès SASPAS  
mars 2016

Chloé RAPP

# Indications

- Douleur aiguë sévère sans voie IV :



- Colique néphrétique
  - Abdomen chirurgical
  - Fracture
  - Douleur thoracique...
- Pas de bénéfice de la voie IM
  - Efficacité en 15 à 30 min, pour 4 à 6h


# Matériel

- Prescription sur ordonnance sécurisée
- Délivrance pour 7 jours
- MORPHINE CHLORHYDRATE  
10mg/mL injectable
- Aiguilles 25G à 28G + 18G
- Seringue stérile de 1mL
- Compresses
- Désinfectant
- Boîte à aiguilles, poubelle
  
- Lavage des mains
- Préparation de la seringue
- Désinfection en escargot



# Injection

- 0,1 mg/kg = 5 à 10 mg chez l'adulte
- Pas de dilution nécessaire
- Injection à 45° dans un bourrelet cutané



# Bibliographie

- Recommandations formalisées d'experts SFMU-SFAR 2010 : sédation et analgésie en structure d'urgence
- Mise au point ANSM: Prise en charge des douleurs de l'adulte modérées à intense. Recommandation après le retrait des associations dextropropoxyphène/paracétamol et dextropropoxyphène/paracétamol/caféine. 16/12/2010.
- Comment bien prescrire un opioïde fort dans les douleurs sévères ? SFMG 2012
- Fiche de préparation et de mise en place de la morphine par voie injectable – CLUD CHU Toulouse